

Bärarkort Ehlers-Danlos syndrom

Bäraren av detta kort har **Ehlers-Danlos syndrom**, en ärftlig bindvävsdefekt. Syndromet orsakar svagheter i kroppens dominerande strukturprotein, kollagen. Detta medför sämre hållbarhet hos bland annat hud, leder, ben och blodkärl som är skörare och lätt kan skadas.

1. **Huden** är skör, extra töjbar och brister lätt, läker sämre med tunna, breda ärr samt blåmärken uppstår lättare
2. **Lederna** är lösa och slappa och går lätt ur led, vilket kan leda till artros
3. **Ben** bryts lättare
4. Mittralklaffs prolaps kan förekomma

Mer information finns på EDS Riksförbunds webbplats:
www.ehlers-danlos.se © 2015-01-21



Till sjukvården / tandvården

1. Behandla denna patient mycket varsamt eftersom blödningar och (sub)luxation av leder lätt uppstår.
2. Kirurgiska suturer skär lätt igenom de sköra vävnaderna så:
 - Undvik kirurgi om så är möjligt
 - Suturer bör placeras tätt och sitta dubbelt så länge som normalt
 - Använd Steri-Strip som alternativ när det är möjligt. Komplettera gärna med täckande plastfilm för att hålla ihop sårkanterna
 - Då noggrann hemostas och korrekt suturering vidtas bör få problem uppstå
3. Vid graviditet finns ökad risk för tidig vattenavgång och prematur börd samt för blödningar före/efter förlossning.
4. Risk för käkluxation vid intubation. Nacken kan vara överrörlig och mjukdelar i halsen ömtåliga.
5. Lokalanestesi kan ha sämre effekt.

